

子宮頸癌

ICD-O-FT T-180
ICD-O-3 C53

編輯：洪啟峰醫師

子宮頸癌病人數在本院居第八位，以 2008 年為例，新病人數佔全國 2.5%。

過去十年來，子宮頸癌篩檢的關係，早期病人是所有癌症中最高的族群，第零及一期病人合計佔總病人數的 78.9%。第零及一期病人以手術治療為主，治療副作用很少，治癒率也很高。第二、三期的病人，則常須合併放射治療及化學治療，才能達到最大的治療效果。

本院治療成果


1990-2009 年間首次確定診斷為子宮頸癌，且之前未曾在院外進行相關治療者共 1,651 人，期別分佈及各期別五年存活率如表一、圖一，年齡中位數 45 歲（19-87）。

表一：和信治癌中心醫院 1990-2009 年子宮頸癌病人 FIGO 期別分佈表及五年存活率

期別	0	I	II	III	IV	不詳	全部
各期別人數	1,099	203	208	55	39	47	1,651
百分比	66.6%	12.3%	12.6%	3.3%	2.4%	2.9%	
五年存活率		92.6%	76.0%	41.7%	15.4%		75.1%



圖一：和信治癌中心醫院 1990-2009 子宮頸癌病人按期別分佈存活曲線圖



第一期後、與二期病人的治療

第一期後、與二期的病人，治療常須合併手術前同步放射治療及化學治療，及子宮全切除術。1990-2009 年間，共有 17 人接受此多學科合併的整合治療，追蹤期間中位數為 94 個月（分佈 6-174 月），五年及十年的整體存活率為 94.1%。


第二期後、與三期病人的治療

第二期後、與三期病人的治療，以同步放射治療及化學治療為原則，1990-2009 年間，共有 130 人接受此合併整合治療，追蹤期間中位數為 48 個月（分佈 7-190 月），五年的整體存活率為 71.4%，十年的整體存活率為 67.8%。各期別存活機會如圖二及表二。

表二：和信治癌中心醫院 1990-2009 年第二期後、與三期子宮頸癌病人接受同步放射治療及化學治療期別分佈表及存活率

期別	IIB	III	全部
各期別人數	100	30	130
五年存活率	77.8 %	52.5 %	71.4 %
十年存活率	77.8 %	41.8 %	67.8 %

圖二：和信治癌中心醫院 1990-2009 年第二期後、與三期子宮頸癌病人接受同步放射治療及化學治療期別分佈存活曲線圖





與國內外資料的比較

至 2010 年底止，五年的整體存活率為 75.1%。如與衛生署公佈台灣 2004-2008 年子宮頸癌五年存活率 69.7% 相比較，本院同時期五年存活率為 76.5%（表三）。

表三：和信治癌中心醫院與全台灣醫療院所 2004-2008 年子宮頸癌病人存活機率比較表（%）

存活率	和信治癌中心醫院		全台灣
	1990-2009	2004-2008	2004-2008
一年	93.5	92.4	89.8
二年	83.7	85.5	81.2
三年	80.1	82.4	75.8
四年	76.7	77.6	72.2
五年	75.1	77.6	69.7

* 資料來源：行政院衛生署國民健康局（2011）

若與美國流行病監督及最終結果 (Surveillance Epidemiology and End Results, SEER) 公佈之 2001-2007 年子宮頸癌存活率 68.6% 相比較，本院同時期五年存活率為 75.3%（表四）。

表四：和信治癌中心醫院與美國 SEER2001-2007 年子宮頸癌病人五年存活機率比較表（%）

存活率	和信治癌中心醫院	美國 SEER#
	75.3	68.6

SEER Cancer Statistics Review1975-2008，相對存活率